

**XXIV ENCUESTO DE RESIDENTES DE
MEDICINA Y ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA DE ASTURIAS y
JORNADAS DE ATENCIÓN PRIMARIA
Cangas del Narcea, 21 y 22 de Abril de 2016**

RESUMEN DE COMUNICACIONES CIENTÍFICAS

Nº de Registro: 13_RESUMEN_TRAB_R4_COLLOTO

Fecha Límite: **18 de marzo de 2016**

Autores: **Imanol Pérez Hevia; M^a Teresa Arias García.**

Centro de Trabajo: **Consultorio de Colloto.**

Palabras Clave: EPOC, Agudización, seguimiento, inhaladores, vacunación.

TÍTULO: ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE NUESTROS PACIENTES EPOC AL ESTADIAJE SEGÚN GSEPOC.

Objetivos:

Estimar el efecto de un correcto seguimiento de los pacientes EPOC sobre la reducción del número de agudizaciones e ingresos.

Metodología:

Investigación Cuantitativa:

- Estudio descriptivo transversal, en pacientes con diagnóstico de EPOC previo a Enero de 2015.
- Se seleccionaron todos los individuos EPOC del área de Colloto (80).

- Investigación Cualitativa:

- Fuente: OMI-AP
- Se realizó una revisión del historial de cada paciente para reclasificarlo dentro de la guía GSEPOC y adecuar su tratamiento a esa clasificación.
- Se comprobó el número de visitas tanto a AP como a neumología .
- Se contactó telefónicamente con los pacientes para preguntarles por la educación en el uso de inhaladores.
- Se revisó el uso de los inhaladores.
- El plan de análisis: SPPS
 - Univariante: Distribución de frecuencias.
 - Bivariante: Tablas de contingencia.

Resultados:

Se incluyen 80 pacientes de una edad media de 72,51 +/- 9,54 y una evolución de la enfermedad media 7,43 años +/- 4,68

Los resultados muestran con un IC del 95%, que no hay significación estadística entre ingresos/agudizaciones y una buena clasificación/correcto tratamiento, obteniéndose un valor de 0,12 y 0,13.

Tampoco existe relación entre vacunación y exacerbaciones con un resultado de 0,12.

Si se encontró diferenciación entre pacientes con revisión en neumología y en relación a paqt/año con resultado de 0,07 y 0,006, siendo los pacientes que acuden a revisión de neumología los que más ingresan.

Conclusiones:

En Colloto no hay una diferenciación significativa entre el buen y mal control en estos pacientes.

Esto lo podemos atribuir a que los pacientes que más seguimientos realizan y mejor tratados están, son los que tienen una mayor gravedad de la enfermedad.

Si se encontró una significación entre el seguimiento en neumología; Paqt/año y reagudizaciones.