



RESUMEN DE COMUNICACIONES CIENTÍFICAS

Fecha Límite: **30 de marzo de 2017**

Nº Registro: **05_RESUMEN_TRAB_EIR2_VEGAS**

Autores: Sánchez Méndez I, Vigil Sánchez AI.

Centro de Trabajo: Centro de Salud de Las Vegas (Corvera)

Palabras Clave: retinopatía diabética, diabetes mellitus tipo 2, atención primaria de salud, prevalencia, satisfacción del paciente.

TITULO: Prevalencia de Retinopatía diabética en una Zona Básica de Salud.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La Retinopatía diabética (RD) es una enfermedad crónica, de elevada prevalencia, y curso progresivo. Segunda causa de ceguera en España y la primera en edad laboral. La prevención secundaria, mediante retinografía digital con cámara no midriática es considerada como la prueba de cribado más adecuada para el despistaje masivo. Estudiamos la prevalencia de RD en nuestra Zona Básica, la aportación del cribado realizado y los conocimientos y satisfacción de los pacientes con éste.

METODOLOGÍA: Estudio descriptivo transversal retrospectivo de los pacientes con episodio abierto de diabetes entre 15/01/2016-15/03/2016. Mediante cuestionario se analizan conocimientos y satisfacción con el cribado realizado en el centro. Realizamos análisis descriptivo con estimación por intervalos de confianza (IC) al 95%.

RESULTADOS PRINCIPALES: Prevalencia RD: 6,9% (IC: 5,6-8,12). Tienen episodio abierto 58%. Prevalencia <10 años evolución de diabetes, es 4,5% (IC:2,94-5,83), mientras >10 años es 9,5% (IC 7,39-11,61). Previo al cribado la prevalencia era 4,41% (IC: 3,38-5,43). Durante éste se detectó un 2,51%. Los entrevistados conocen los motivos del cribado (74%) y no conocen (23%). El 77% manifiesta haber recibido información de Enfermería. Consideran buena o muy buena la atención y las instalaciones (98,1% y 88,2% respectivamente).

CONCLUSIONES: La Prevalencia RD es del 6,9%, posiblemente infraestimada por la baja apertura de episodios. Esta se incrementa con el tiempo de evolución de diabetes. El cribado incrementa la prevalencia en un 57%. Los conocimientos sobre RD de los pacientes cribados son adecuados aunque un 23% desconoce su finalidad. No se demuestra relación entre los conocimientos de los pacientes y la educación sanitaria que manifiestan. Existe alta satisfacción con la atención y las instalaciones. Los pacientes con RD están satisfechos con la información de los resultados aunque un 22% manifiesta no haber sido informado. Los encuestados en su mayoría prefieren AP o les es indiferente el lugar de realización del cribado.



(1) Preferencia de presentación:
Formato póster X
Formato oral X